

**Tabelle 1 | Impfkalender 2026 (Standardimmunisierungen mit Impfstoffen und monoklonalen Antikörpern); für Indikationsimpfungen wird auf Tabelle 2 verwiesen**

**A – Säuglinge und Kleinkinder < 5 Jahre (0–59 Monate)**

Impfung/Immunisierung	Alter in Wochen			Alter in Monaten										
	0	4	6	2	3	4	5–6	7–10	11*	12	13–14	15	16–23	24–59
	U2	U3		U4			U5		U6				U7	U7a/U8
Respiratorische Synzytial-Viren	mAk (Einmaldosis) je nach Geburtsmonat <sup>a</sup>													
Rotaviren		G1 <sup>b</sup>	G2	(G3)										
Tetanus <sup>c</sup>		G1		G2				G3 <sup>f</sup>						
Diphtherie <sup>c</sup>		G1		G2				G3 <sup>f</sup>						
Pertussis <sup>c</sup>		G1		G2				G3 <sup>f</sup>						
Hib <sup>c</sup> – <i>H. influenzae</i> Typ b		G1		G2				G3 <sup>f</sup>						
Poliomyelitis <sup>c</sup>		G1		G2				G3 <sup>f</sup>						
Hepatitis B <sup>c</sup>		G1		G2				G3 <sup>f</sup>						
Pneumokokken <sup>c,d</sup>		G1		G2				G3 <sup>f</sup>						
Meningokokken B <sup>e</sup>		G1		G2				G3 <sup>f</sup>						
Masern, Mumps, Röteln								G1			G2			
Varizellen								G1			G2			

**B – Kinder ≥ 5 Jahre, Jugendliche und Erwachsene**

Impfung	Alter in Jahren									
	5–6	7–8	9–11	12–14	15–16	17	18–24	25–59	60–74	ab 75
	U9	U10	U11	J1		J2				
Tetanus	A1			A2					A <sup>h</sup>	
Diphtherie	A1			A2					A <sup>h</sup>	
Pertussis	A1			A2				A3 <sup>h</sup>		
Poliomyelitis				A1						
Hepatitis B										
HPV – Humane Papillomviren			G1 <sup>g</sup> /G2 <sup>g</sup>							
Meningokokken ACWY				G1						
Masern							S <sup>i</sup>			
Mumps, Röteln										
Varizellen										
Pneumokokken									S <sup>k</sup>	
Herpes zoster								G1 <sup>l</sup> /G2 <sup>l</sup>		
Influenza									S (jährlich) <sup>m</sup>	
COVID-19							Gx <sup>j</sup>		S (jährlich) <sup>m</sup>	
Respiratorische Synzytial-Viren									S <sup>n</sup>	

■ Empfohlener Impfzeitpunkt

■ Empfohlener Zeitraum für die Verabreichung der mAk

■ Nachholimpfzeitraum für Grund- bzw. Erstimmunisierung und Verabreichung der mAk

a Zwischen April und September Geborene sollen Nirsevimab im Herbst vor Beginn ihrer 1. RSV-Saison erhalten; Neugeborene jeglichen Gestationsalters, die während der RSV-Saison (meist zwischen Oktober und März) geboren werden, sollen Nirsevimab möglichst rasch nach der Geburt erhalten, idealerweise bei Entlassung aus der Geburtsseinrichtung bzw. bei der U2 (3.–10. Lebenstag).

b Erste Impfstoffdosis bereits ab dem Alter von 6 Wochen, je nach verwendetem Impfstoff 2 bzw. 3 Impfstoffdosen im Abstand von mind. 4 Wochen

c Frühgeborene: zusätzliche Impfstoffdosis im Alter von 3 Monaten, d. h. insgesamt 4 Impfstoffdosen

d Säuglinge (inkl. Frühgeborene) werden mit PCV13 oder PCV15 geimpft

e Gemäß Fachinformation besteht die Impfserie im Alter von 2–23 Monaten aus 3 Impfstoffdosen, ab dem Alter von 24 Monaten aus 2 Impfstoffdosen

f Mindestabstand zur vorangegangenen Impfstoffdosis: 6 Monate

g Zwei Impfstoffdosen im Abstand von mind. 5 Monaten, bei Nachholimpfung beginnend im Alter ≥ 15 Jahre oder bei einem Impfabstand von < 5 Monaten zwischen 1. und 2. Impfstoffdosis ist eine 3. Impfstoffdosis erforderlich

h Td-Auffrischimpfung alle 10 Jahre. Nächste fällige Td-Impfung einmalig als Tdap- bzw. bei entsprechender Indikation als Tdap-IPV-Kombinationsimpfung

i Eine Impfstoffdosis eines MMR-Impfstoffs für alle nach 1970 geborenen Personen ≥ 18 Jahre mit unklarem Impfstatus, ohne Impfung oder mit nur einer Impfung in der Kindheit

j Impfung bis die Anzahl der für die Basisimmunität erforderlichen ≥ 3 SARS-CoV-2-Antigenkontakte (davon mindestens 1 Impfung) erreicht ist. Mindestimpfabstand zwischen G1 und G2 ≥ 4 bis vorzugsweise 12 Wochen, und zwischen G2 und G3 ≥ 6 Monate

k Impfung mit PCV20

l 2 Impfstoffdosen des adjuvanierten Herpes-zoster-Totimpfstoffs im Abstand von 2 bis 6 Monaten

m Jährliche Impfung (einmalig pro Saison) im Herbst (COVID-19) bzw. Herbst/Winter (Influenza)

n 1-malige Impfung mit einem proteinbasierten oder mRNA-RSV-Impfstoff im Spätsommer/Herbst vor Beginn der RSV-Saison

\* Impfungen können auf mehrere Impftermine verteilt werden. MMR und V können am selben Termin oder mit einem Mindestabstand von 4 Wochen verabreicht werden

G Grundimmunisierung

A Auffrischimpfung

S Standardimpfung

mAk monoklonale Antikörper

U/J Vorsorgeuntersuchungen für Kinder und Jugendliche